

# Chlamydia y su Bebé

## **¿Qué es chlamydia?**

Chlamydia (“Chla-mid-i-a”) es la más común y uno de las más perjudiciales de las infecciones transmitidas sexualmente en los Estados Unidos. Más de 4 millones de personas padecen infecciones de chlamydia. Chlamydia es más común que la gonorrea y las infecciones herpéticas.

## **¿Cómo afecta chlamydia a las mujeres?**

Mujeres infectadas con chlamydia pueden desarrollar cicatrices y obstrucción de los tubos. Esto podría resultar en la infertilidad o en un embarazo ectópico.

## **¿Cómo afecta chlamydia a los bebés?**

El bebé puede nacer prematuro. Los bebés también pueden tener una infección seria de los ojos ó pulmonía.

## **¿Qué puedo hacer para prevenir chlamydia?**

- Si no le han probado, está en su mejor interés de examinarse por un médico o enfermera.
- Pregunte a su doctor o enfermera acerca de la prueba para chlamydia.
- Si tiene la enfermedad, tome su medicina hasta se acabe.
- Hable con su pareja sexual si usted tiene chlamydia, él ó ella se debe hacer la prueba para chlamydia.
- Límite el número de parejas sexuales.
- Use condones cuando tiene relaciones sexuales.

## **¿Cómo sé si he infectado a mi bebé?**

- La mayoría de los bebés que desarrollan la infección se enferman durante las primeras semanas de vida hasta los 6 meses de edad.
- Algunos bebés tendrán una descarga acuosa ó infectada de los ojos. Sus párpados se verán hinchados.
- Algunos bebés pueden desarrollar un apetito pobre, infecciones del oído, congestión de la nariz, síntomas de resfriado, tos, una fiebre ligera, o tendrá problema para dormirse.

## **¿Qué debo hacer si creo que mi bebé está infectado con chlamydia?**

Lleve su bebé a ver a un doctor o enfermera para comprobación y tratamiento.

**Para conseguir más información, llama a: \_\_\_\_\_.**